

表 8-9 H. pylori 除菌療法

一次除菌療法

オメプラール(20 mg) 2錠  
 オメプラゾン(20 mg) 2錠  
 タケプロン(30 mg) 2錠  
 パリエット(10 mg) 2錠

ランサップ 400 もしくは 800

いずれか+サワシリン(250 mg)カプセル 6カプセル+  
 クラリス(200 mg)2もしくは4錠  
 分2 朝・夕食後 7日間

二次除菌療法

オメプラール(20 mg) 2錠  
 オメプラゾン(20 mg) 2錠  
 タケプロン(30 mg) 2錠  
 パリエット(10 mg) 2錠

いずれか+サワシリン(250 mg)カプセル 6カプセル+  
 フラジール(250 mg)2錠  
 分2 朝・夕食後 7日間

三次除菌療法の例(保険適用外)

オメプラール(20 mg) 4錠  
 オメプラゾン(20 mg) 4錠  
 タケプロン(30 mg) 4錠  
 パリエット(10 mg) 4錠

いずれか+サワシリン(250 mg)カプセル 8カプセル  
 分3~4 14日間

オメプラール(20 mg) 2錠  
 オメプラゾン(20 mg) 2錠  
 タケプロン(30 mg) 2錠  
 パリエット(10 mg) 2錠

いずれか+フラジール(250 mg)2錠+ミノマイシン  
 (100 mg)2錠  
 分2 7日間