

尿素 urea

2669

*ウレパール Urepearl (大塚)

クリーム(20・50g/本)・ローション(20・50g/本) :
10%

*ケラチナミン Keratinamin (興和)

軟膏(25・50g/本) : 20%

*バスタロン Pastaron (佐藤製薬)

ソフト軟膏(20・50g/本) : 10% (25・50g/本) : 20%
クリーム(20・50g/本) : 10% (25g/本) : 20%
ローション(20・50g/本) : 10%

アセチコール(ポーラ[㊦]20%), 尿素(小堺[㊦]), アセチコール(ポーラ[㊦]10%), ウリモックス(池田薬品[㊦]10%), ウレアクリーム(岩城[㊦]20%), ケラベンス(シオノ[㊦]20%), ベギン(藤永[㊦]10/20%), ワイドコール(池田薬品[㊦]20%)

※ウレパール: クリーム(¥7.80/10%/g), ローション(¥7.80/10%/g) ケラチナミン: 軟膏(¥8.10/20%/g) バスタロン: ソフト軟膏(¥7.70/10%/g, ¥7.90/20%/g), クリーム(¥7.70/10%/g, ¥7.90/20%/g), ローション(¥7.70/10%/g)

10% : 1日2~3回 塗布し, よく擦り込む

20% : 1日1~数回 塗擦

作用 角質の水分保持増加作用, 溶解剥離作用により, 魚鱗癬患者の魚鱗様紋理を軽快させ, また乾皮, 角化皮膚をしっかりとさせる

適応 魚鱗癬, 老人性乾皮症, アトピー皮膚, 進行性指掌角皮症(主婦湿疹の乾燥型), 足趾部皸裂性皮膚炎, 掌趾角化症, 毛孔性苔癬, (ウレパールL)頭部枇糠疹

慎重 1)炎症, 亀裂を伴う症例(一過性の刺激症状) 2)皮膚刺激に対する感受性が亢進している症例(一過性の刺激症状)

注意 (適用上) ①皮膚外用以外には使用不可 ②潰瘍, びらん, 傷面への直接塗擦回避 ③手指につけて眼に触れない **(その他)** ステンレスヘラに長時間接触放置で錆びることあり

副作用 1)皮膚(20%) (びりびり感, 疼痛, 紅斑, 痒痒感, 灼熱感, 丘疹, 落屑等)→症状が強い場合中止 2)刺激症状(10%) (疼痛, 熱感, 潮紅, 痒痒感等刺激症状) 3)過敏症(10%)→中止し対症療法を行う 4)その他(10%) (湿疹化, 皮膚の亀裂, 丘疹, 腫脹, 乾燥化)→症状が強い場合は中止し, 対症療法を行う

臨床解説 尿素

適用外使用 汗疱: 1日2回塗布, (村木良一)