

体が回るようなめまい 42 歳女性 書籍 869 頁参照

現病歴：会社員(事務職)。1 か月ほど前から体が回るようなめまいがするようになった。最近では、3 日前にめまいが起き、耳鳴と悪心も伴って、2 日間会社を休まないといけないほどであった。めまいが強いときは目も開けていられないほどで、寝返りも打てない状態で終日床に就いていた。思い出すとこの 1 年間に同じめまいが起きて会社を休んだことが 2 回あった。このようなめまいを主訴に近くの医院を受診した。めまいの誘因は特に自覚していない。

既往歴：会社の健康診断で 3 年前から右耳の聴力低下を指摘されていた。

身体所見：意識は清明。身長 165 cm, 体重 59 kg, 体温 36.1°C, 脈拍 68 回/分(整), 血圧 124/82 mmHg, 呼吸数 14 回/分。呼吸音, 心音はいずれも正常。

神経学的所見：右耳の聴力が軽度低下していた。左向きの水平性・回旋性の混合性眼振が、患者が右・左のいずれの方向を見ても認められた。

■ 診断の進め方

特に見逃してはいけない疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

頻度の高い疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

■この時点で何を考えるか？ 医療面接と身体診察を総合して考える点

(可能性の高い疾患とその理由、除外診断とその理由などを挙げる)

ここに記入

診断仮説 (仮の診断) (可能性が高いと考えられる疾患を挙げる)

ここに記入

■ 必要なスクリーニング検査 (診断を絞り込むために必要な検査を挙げる)

ここに記入

■ 検査結果

血球・血液生化学・血液凝固所見 : WBC 6,200/ μ L, RBC 420 万/ μ L, Plt 21.5 万/ μ L,
AST 25 U/L, ALT 28 U/L, CRP 0.06 mg/dL, PT 10.9 秒, APTT 29.3 秒.

頭部単純 MRI : 異常なし.

診断仮説（仮の診断）（可能性が高いと考えられる疾患を挙げる）

ここに記入

ここに記入

■ 診断確定のために（必要な追加検査などを挙げる）

ここに記入

ここに記入

診断 (診断結果を記入)

ここに記入

■治療の基本方針 (診断を受けて必要な治療を挙げる)

ここに記入