

気道内加湿法(ネブライザーによる)

1 準備

ネブライザーを準備する

2 患者氏名と準備した薬剤が指示書通りであるか確認する

3 噴霧槽と薬液カップを取り外し、蒸留水を作用水槽の水位線まで入れる



4 薬液カップホルダーに薬液カップを装着する

5 薬液カップに指示された吸入薬剤または生理食塩水を入れ((①)),噴霧槽をセットする((②))



●ジェットネブライザーの場合

- ・吸入器(嘴管(しかん))に薬液を入れる



●ジェットネブライザーの場合

- ・嘴管を軽くくわえてもらう



6 蛇管を噴霧槽の送風口へ差し込んで接続する

7 患者に合わせて、マスクまたはマウスピースをセットする




1 吸入を実施する

患者に目的と実施内容、方法、所要時間について説明する

2 呼吸しやすいように座位、またはファウラー位をとる

3 マウスピースを軽くくわえてもらう



4 風量と噴霧量を調節し、吸入を開始する

5 吸入中は排痰しやすいよう、ティッシュペーパーを手元に置いておく

6 必要な患者にはすぐに吸引できるよう、準備しておく

7 呼吸困難や、気分不快などの症状が生じたら知らせるよう説明する

8 吸入終了後はうがいを促す