

血糖値異常時指示

血糖値 400 mg/dL 以上でドクターコール

血糖値 70 mg/dL 以下のとき

内服可能時：ブドウ糖 10 g 内服

内服困難時：50% ブドウ糖 20 mL 2 A 静注し、ドクターコール。30 分後血糖再測定

血圧上昇時指示

収縮期血圧 180 mmHg 以上でドクターコール

血圧低下時指示

収縮期血圧 90 mmHg 以下ならドクターコール

頻脈時指示

心拍数 > 120 回/分以上なら、血圧測定しドクターコール。12 誘導心電図施行

徐脈時指示

心拍数 < 50 回/分以下なら、血圧測定しドクターコール。12 誘導心電図準備

体温指示

体温 38°C 以上のとき、血液培養 2 セットを初回のみ採取し、ドクターコール

患者の解熱希望がある際は（症状緩和目的）

1) 内服可能時：アセトアミノフェン錠 200 mg 2 錠内服（6 時間あけて再投与可，1 日 4 回可）

2) 内服困難時：アセトアミノフェン坐剤 200 mg 2 個挿肛（6 時間あけて再投与可，1 日 4 回可）

3) 発熱が持続すればドクターコール

体温 35°C 未満のとき：ドクターコール

酸素飽和度指示

SpO₂ 93% 以上をキープ

SpO₂ 95% 以上のとき、酸素 1 L/分漸減

SpO₂ 89% 以下のとき、酸素 1 L/分漸増

1~4 L/分：経鼻カニューラ

5~10 L/分：フェイスマスク

10 L/分以上：リザーバーマスク

酸素 5 L/分以上を要するとき、ドクターコール

疼痛時指示

アセトアミノフェン錠 200 mg 2 錠内服（6 時間以上あけて，1 日 4 回可）

内服困難時：アセトアミノフェン坐剤 200 mg 2 個挿肛（6 時間あけて再投与可，1 日 4 回可）

上記で疼痛緩和困難時、ドクターコール

不眠時指示

ラメルテオン錠 8 mg 1 錠内服 眠前 1 回開始

またはスボレキサント錠 15 mg 1 錠内服 それでも不眠が続けばドクターコール

不穏時指示

ドクターコール

糖尿病の合併なし：クエチアピン錠 25 mg 1 錠内服

糖尿病の合併あり：リスペリドン内用液 0.5 mg 1 回内服

内服困難時：ハロペリドール注 5 mg 1/2A + 生食 100 mL 30 分で点滴静注

便秘時指示

排便が 3 日以上ないとき、まず排便を行い、排便がない際はセンノシド (12 mg) 1 錠内服。それでも排便が得られないとき、

- 1) ピコスルファートナトリウム内用液 1 日 1 回 10~15 滴
- 2) レシカルボン坐剤^{*1} 1 個挿肛
- 3) ドクターコール

嘔気・嘔吐時指示

ドクターコール

内服可能時：メトクロプラミド錠 5 mg 1 錠内服, ドンペリドン錠 10 mg 1 錠内服

内服困難時：メトクロプラミド注 10 mg 1 A 点滴静注

内服(注射)開始・中止指示

なし

*1 一般名：炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム