

『リウマチ病診療ビジュアルテキスト 第3版』正誤表

このたびは『リウマチ病診療ビジュアルテキスト 第3版』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本書第1刷（p.152, 表5-8）におきまして以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに
深くお詫び申し上げます。

2023年1月作成

【誤】

表 5-8 DAS28, SDAI, CDAI

DAS28ESR・CRP		
①	100 mm の VAS による患者の全般的評価	
②	28 関節中の圧痛関節数	
③	28 関節中の腫脹関節数	
④	赤沈 1 時間値 (DAS28ESR) あるいは CRP 値 (DAS28CRP) を規定の計算式に入力して計算する	
DAS28	高疾患活動性	> 5.1
	中等度疾患活動性	$3.2 \leq 5.1$
	低疾患活動性	$2.6 \leq 3.2$
	寛解	< 2.6
SDAI		
①	10 cm の VAS による患者の全般的評価	
②	10 cm の VAS による医師の全般的評価	
③	28 関節中の圧痛関節数	
④	28 関節中の腫脹関節数	
⑤	CRP 値	
①～⑤を加算して評価する		
	高疾患活動性	> 26
	中等度疾患活動性	11.1～26
	低疾患活動性	3.3～11
	寛解	< 3.3
CDAI		
①	10 cm の VAS による患者の全般的評価	
②	10 cm の VAS による医師の全般的評価	
③	28 関節中の圧痛関節数	
④	28 関節中の腫脹関節数	
①～④を加算して評価する		
	高疾患活動性	> 22
	中等度疾患活動性	10.1～22
	低疾患活動性	2.8～10
	寛解	< 2.8

VAS (visual analogue scale) = 目測定規, global assessment : GA
(安倍千之 : Clin Rheumatol 23 : 344, 2011 より参考抜粋)

【正】

表 5-8 DAS28, SDAI, CDAI

DAS28ESR・CRP		
①	100 mm の VAS による患者の全般的評価	
②	28 関節中の圧痛関節数	
③	28 関節中の腫脹関節数	
④	赤沈 1 時間値 (DAS28ESR) あるいは CRP 値 (DAS28CRP) を規定の計算式に入力して計算する	
DAS28	高疾患活動性	> 5.1
ESR	中等度疾患活動性	$3.2 \sim 5.1$
	低疾患活動性	$2.6 \sim 3.2$
	寛解	< 2.6
SDAI		
①	10 cm の VAS による患者の全般的評価	
②	10 cm の VAS による医師の全般的評価	
③	28 関節中の圧痛関節数	
④	28 関節中の腫脹関節数	
⑤	CRP 値	
①～⑤を加算して評価する		
	高疾患活動性	> 26
	中等度疾患活動性	11.1～26
	低疾患活動性	3.3～11
	寛解	< 3.3
CDAI		
①	10 cm の VAS による患者の全般的評価	
②	10 cm の VAS による医師の全般的評価	
③	28 関節中の圧痛関節数	
④	28 関節中の腫脹関節数	
①～④を加算して評価する		
	高疾患活動性	> 22
	中等度疾患活動性	10.1～22
	低疾患活動性	2.8～10
	寛解	< 2.8

VAS (visual analogue scale) = 目測定規, 全般的評価 (global assessment)
(安倍千之 : Clin Rheumatol 23 : 344, 2011 より参考抜粋)